

Инструкция по применению Manhao(суперёмкость) полоски флувалината

Наименование ветеринарного препарата

Общее название: полоска флувалината

Торговое название: Wang's Manhao


Международное непатентованное название: Fluvalicinate Strip

Химическое название: n-[2-хлор-4-(трифторметил)фенил]-(Dl)-валин, циано-группа-(3-феноксил) метиловый эфир.

Молекулярная формула: $C_{26}H_{22}ClF_3N_2O_3$

Молекулярный вес: 502,92

Структурная формула:



Форма выпуска: жёлтая или оранжево-жёлтая полоска со слабым специфическим запахом.

Фармакологическое действие: противоакарицидное средство, изготовленное высококачественным сырьём по новой технологии. Средство действует путём контакта с клещей или на желудок клещей. Данное лекарство обладает суперёмкостью-- одна упаковка имеет 80 полосок препарата. Пчела, контактировавшая с препаратом, передает его разным акарапидозам пчёл, тем самым вызывая гибель клещей. Препарат безопасен для пчёл и не обнаруживается в продукции пчёл. Действие препарата проявляется через полчаса после помещения в улей. Через 21-28 дней полоски с препаратом вынимают из улья, чтобы не возникло резистентности клещей к этому препарату. Данное средство проявляет оптимальную эффективность и скорость уничтожения клещей и безопасен для окружающей среды.

Показания к применению: профилактическое лечение от клещей.

Дозы и способ применения:

По отверстию и тиснению на полоске разрезать полоску

1 способ подвешивания полоски : в простом улье на 10 и более 10 рамок применяется 2полоски, подвешивается в разных частях улья в целях равно распространения дозы полоски. а в улье на меньше 10 рамок применяется 1 полоска, подвешивается в главной улочке. Следует избегать касания медовой соты. Спустя 7-10 дней добавить препарат .

2 способ введения полоски в леток : вводить полоску в леток на диагональном направлении под углом 45°, после 5 дней перевертывать полоску, через 10 дней переменять одну полосу, доза одинаковая со способом подвешивания полоски .

3 в улье мало рамок или при состоянии тяжелого клещей доза должна наладится сообразно с обстоятельствами

Время применения: целый год .оптимальное время применения является периодами разведения до весеннего и после осени поздним периодом медосбора. А наилучшее время применения является солнечной погодой первой части дня.

Побочные действия: данный препарат не вызывает нежелательных реакций, лекарственная устойчивость зависит от рода пчёл (мегахилиды) или состояния здоровья, чувствительности пчелиного роя, стадии развития пчёл, иногда появляется ползание пчёл. Применяют необходимые меры при отклонениях от нормы.

Противопоказания: не использовать данный препарат при температуре ниже 15 °С или если пчелосемье не хватает сахара. Не допускается совместное использование настоящей продукции с другим основным препаратом во избежание потери эффекта.

Особые указания:

1. Запрещается применять во время медосбора. Не советуется применять для перегонных групп пчёл и в начале оставления пчелосемьи на пасечной площадке.
2. Рекомендуется испытать препарат на 2-3 группах пчёл, чтобы определить дозы и способ применения. Во время применения лекарства необходимо усилить внимание и рассмотреть причины исключительных случаев, и своевременно регулировать способ применения лекарства и дозы.
3. В случае склеивания или влажности полоски с лекарством после распаковки, рекомендуется сушить в прохладном, защищенном от солнца месте.
4. Данный препарат является сильным ядом для рыб и шелкопряда.
5. Хранить в недоступном для детей месте и отдельно от продуктов и других химических веществ.
6. Не использовать во время цветочного взятка.

Форма выпуска: 40мг/полоска и 80 полосок в пакете.

Срок годности: 4 года.

Условия хранения: в темном, прохладном месте.

Производитель: Sichuan Wangshi Animal Health Co., Ltd

Регистрационный номер препарата: серия 2006 220662114

Адрес: КНР, про Сычуань, г. Чэнду, зона экономического развития «Синаньханконган»